FACULTAD DE GEOLOGIA Y GEOPISICA ISMM - Moa

Trabajo de Diploma

Características Geólogo - Geomorfológica de la zona de desarrollo de las C.I. ferroniqueliferas del territorio NE de la zona Oriental.

Diplomante: Victor J.Estrada Sanabria Abraham Fuentes Díaz Tutor: Ing.Alina Rodríguez Infante

INDICE

cohrenzo	I as	Introducción	1
Capitulo	II -	Características físico - geográfico de la	
		región.	
		Introducción	16
	2.1-	Ubicación Geográfica	2
		Clima	
		Relieve	
		Hidrografía y Vegetación	
		Economía	
		Vías de Comunicaciones	
Capitulo	II -	Historia de las Investigaciones Anteriores	
	3.1-	Estudios Geológicos Regionales del Territo-	
		rio Mayari - Baracoa	75
*	3.2-	Investigaciones Geomorfológicas	10
	3.3-	Estado actual de la Busqueda y Exploración-	11
Capitulo	IV -	Metodología usada en las investigaciones	12
Capitulo	V -	Geología Regional	
Capitulo	V -	Geología Regional Introducción	15
Capitulo			
Capitulo	5.1-	Introducción	16
Capitulo	5.1-	Introducción	16 24
Capitulo	5.1- 5.2- 5.3-	Introducción Estratigrafía Estratigrafía Estratigrafía Estratigrafía	16 24 26
Capitulo	5.1- 5.2- 5.3- 5.4-	Introducción ————————————————————————————————————	16 24 26
Capitulo	5.1- 5.2- 5.3- 5.4-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo	16 24 26 28
Capitulo	5.1- 5.2- 5.3- 5.4-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien	16 24 26 28
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien	16 24 26 28
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area	16 24 26 28 31
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5-	Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales	16 24 26 28 31
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales Introducción	16 24 26 28 31
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5- VI -	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales Introducción Características Geomorfológicas de la Re -	16 24 26 28 31 33
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5- VI - 6.1-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales Introducción Características Geomorfológicas de la Re gión. Estudio y Distribución de las pendientes. Análisis de los mapas de Isobasitas y de di	16 24 26 28 31 33 34 35
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5- VI - 6.1- 6.2- 6.3-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales Introducción Características Geomorfológicas de la Re - gión. Estudio y Distribución de las pendientes. Análisis de los mapas de Isobasitas y de diferencia de Isobasitas.	16 24 26 28 31 33 34 35
	5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5- VI - 6.1- 6.2- 6.4-	Introducción Estratigrafía Tectónica Magmatismo Corteza de intemperismo Caracterización cualitativa de los movimien tos neotectónicos que han afectado el area Características Geomorfológicas Regionales Introducción Características Geomorfológicas de la Re gión. Estudio y Distribución de las pendientes. Análisis de los mapas de Isobasitas y de di	16 24 26 28 31 33 34 35 37 38

Capítulo VII. - Clasificación de las zonas de corteza intemperismo ferroniquelifera, en función de su perspectividad.

	7.3	Criterios para la zonación del área	
		en zonas perspectivas 4	13
	7.2	Metodología de los trabajos 4	4
	7.3	Análisis de los resultados para la valoración pronóstico 4	
- 1			
Japitulo	V alexandra alexa 🚭 🗪	- Conclusiones y recomendaciones 4	8
		Bibliograffa.	50

Resumen.

En el presente trabajo se podrá observar la aplicación práctica de los métodos morfométricos en la región que abarca los mapastopográficos de: Cañete, Cayoguqueque, Duabas, Baracoa y Sabana; además de la metodología de elaboración de los diferentes mañas. Obteniendo del análisis de estas conclusiones sobre las formas de del relieve y la relación con este de los distintos tipos de de pósitos de cortezas de intemperismo ferroniquelifera. Además de evidenciarse la formas en que se manifiesta la influencia de los movimientos nectectónicos sobre el relieve.

Luego de desarrollada ha zonación geomorfológica se procede a efectuar una valoración pronéstico de las perspectividad econó

mica de los diferentes depósitos.

CAPITULO NºI.

El presente trabajo "CARACTERISTICAS GEOLOGO -GEOMORFOLOGI-CAS DE LAS ZONAS DE DESARROLLO DE LA CORTEZA DE INTEMPERIS MO FERRONIQUELITERAS DEL TERRITORIO NE DE LA ZONA ORIENTAL" es el resultado de la aplicación de los métodos geólogogeomorfológico con el objetivo de efectuar una valoración pronéstico del desarrollo de la corteza de intemperísmo -ferroniquelífero de la región comprendida por los mapas topográficos de: Cañete (52771), Yacayoguaneque (5277 II), Duaba(5276 I), Baracoa (5377 III), Sabana (5374 IV), a escala 1:50000.

Este trabajo forma parte de la colaboración científica del centro de investigaciones geológicas y el ISMM (Dpto de Geología bajo el título "Análisis estructural del Macizo Maya ría-Baracoa".

Para su elaboración se interpretaron las cartas topográficas a escala 1:50,000 para posteriormente efectuar los mapas de pendientes, mapas de isobasitas, mapas de diferencia de isobasitas, mapas de retiete residual y los mapas de — zonación geólogo-geomorfológica, dentro de esto se reflejó los valores de disección vertical y horizontal para cada zona respectivamente. Se confeccionaron por último los mapas pronósticos para la valoración del grado de perspectividad de las zonas geomorfológicas, tomando como base el mapa geo lógico elaborado por la brigada Cubano-Mingara a escala — 1:1000 000.

También abordamos durante nuestro trabajo la influencia delos movimientos neotectónicos en la región, apoyándonos pen lo planteado por V.E.Jain en lo referente a los múltiples índices que lo denotan.

El trabajo consta de un total de 8 Capítulos constitujendola parte especial los tres últimos capítulos. Además de poposeer un total de 8 anexos gráficos.

La dirección durante todo el desarrollo de trabajo estuvo - a cargo de nuestra tutora Ing. Alina Rodríguez Infante.

INTRODUCCION ...-

El presente Capítulo resume por epígrafe las características Físico-Geográficas, económicas, así como las vías de comunicaciones existentes en nuestra región de trabajo. Esta tiene como núcleo-de población principal la ciudad de Baracoa, aunque existen varios poblados, pero de importancia local.

CAPITULO No. 2

Características Físico - Geográfica de la región.

2.1. Whicación geográfica.

Nuestra región de estudio en sentores que corresponden fundamentalmente al municipio de Baracoa perteneciente a la provincia de Guantánamo (Atlas Nacional de Guba).

La misma tiene como limite: al norte al Océano Atlántico, al Sur La Sierra del Purial, al Oeste cen las Guchillas de Mea, al Este con las terrazas de Maisí; con un área total de 1428km².

La sona popográfica correspondiente a nuestra región de trabajosen:

Hoja	Me	
-Gafiete	5277	I
-Cayoguaneque	5277	II
-Duaba	5276	I
-Baracoa	5377	III
-Sabana	5374	IV

Las corrdenadas que limitan muestra región de trabajo sons

Coordenadas planas de Lambert			Geográficas		
Punto			y /	Tetitud.	Longitud
1.		718000	220000	20040*	749451
2.		718000	170000	20°10°	74045
3.		770000	170000	209101	749151
4.		770000	207000	20°30°	740151
5.	sac del	744000	207000	200300	74030*
6.		744000	220000	20040	749301

2.2. Clima.

El clima es un agente modificador del carácter del relieve y uno de los principales factores en la formación de los suelos y de la corteza de intemperísmo, este determina el nivel y regimenes de los ríos, lagos, pantanos y aguas subterráneas.

Por datos extraídes de Atlas Nacional de Cuba, la temperatura media anual es de 26°C e más para zonas aledañas - a las costas, siende de 20-23°C para las zonas mentañosas También para la precipitación anual se presenta en las ecercanías de las costas un valor de 1300mm, en cambio enla zona mentañosa comprende valores entre 1500-1800mm.

Aquí los períodes de lluvias y de secas son inverso al — resto de Cuba, el período de lluvia (Neviembre-Abril) con valores de 600 a 1000mm y el període de seca (Mayo-Octubre) con valores de 400-800mm, siendo el escurrimiento — superficial de 10-15 L/S por Km².

El coeficiente hidrométrico para el período de lluvia esde 1,0-2,0 excepto algunos sectores de la Cuenca del Toadonde es de 3.0.

2.3. Relieve.

El mismo en la región según datos contenidos del Atlas Nacional de Cuba varía desde llanuras costeras abrasivo-demu
dativas de origen marino en algunas partes y otras son ero
sivo-acumulativa (flæviales), hasta un relieve montañoso donde estan presentes los domos-bloques, erosivo tectónico
que corresponden a los macizos pre-alpinos y alpinos antiguos representados por montañas bajas diseccionadas, de alturas entre 1000-2000m, nombradas Sierra del Purial y los bloques erosivos-tectónicos que son masizos alpinos medios integrados por montañas muy diseccionadas las cuales son conocidas con el mombre de Cuchillas del Toa.

Las comas absolutas máximas presentes en la región donde - desarrollamemos nuestro trabajo en el rango de los 800-1000 m ubicandose estas en la parte Sur Occidental coincidiendo con la Sierra del Purial, a la cual le corresponde un é-drea de 50-80km² en nuestra zona de trabajo.

Les Guchilles del Toa que constituyen del múcleo montañoso central de nuestra región tiene cota máxima con valores — que oscilan entre 600-700m, caracterizadas éstas por susladeras brutas.

Es necesario señalar que en juestra región se observa la presencia del relieve cársico, dende el desarrelle de la red fluvial es nulo pues el drenaje es esencialmente subte
rráneo ocupañão un área de 12km² aproximadamente.

.2.4. Hidrografía y Vegetación.

La red hidrográfica de la región presenta gran desarrollo destacándose la presencia de 4 cuencas hidrográficas principales:

1 .- Quenca Hidrográfica del río Toa.

Tiene un área de 1060km², la compoenen el río Toa y sus - afluentes. El río Toa, el más caudaloso de Cuba nace en las alturas de Sagua-Baracoa y desemboca al NW de la Ciudad de Baracoa con una longitud de 120km en su curso. Como principales afluentes tiene a los ríos: Narahjo, Jaguaní y Quibiján.

2.- Cuenca Hidrográfica del río Duaba.

Tiene un área de 50-250km², está formada por el río Duaba que recibe las aguas de numerosos arreyos y el nacimiento de este se ubica en la cercanía del pueblo de similar nom bre desembocando en Boca del Buaba al NW de la ciudad de Baracoa y al NF de Playa de Toa.

3 .- Cuenca Hidrográfica del río Miel.

Su área es de 50-250km². Está formada por la confituenciade Dos Bocas de los ríos Minas y Sabanilla. Desemboca en la Bahía de Miel al Este de Baracoa.

4 .- Cuenca Hidrográfica del Río Yumurí.

Su rió fundamental es Yumuri con nacimiento en Sierra del Purial, este corre en dirección SW-NE para desembocar al-Océano Atlántico en Boca de Yumuri, Sus afluentes son el rio Guague y los arrojos las Hayas, el Yarey.

Además existe la cuenca secundaria formada por los ríos - Matas, Baes y Roble cuya área es inferior a los 50km². El tipo de vegetación predominante en las zonas montañosas de nuestra región de trabajo son los bosques aciculifolios con vegetación arbórea, renovada en los taladoss—con pinos de Mea, pero en las montañas bajas y mentículos pedregosos cercanos a la costa se observan bosques planifolios polidominantes con vegetación arbórea y arbústica-renovada ocasionalmente.

2.5. Foomemia.

Desde el punto de vista económico natural más importante de esta región es un enorme riqueza derestal representada por maderas preciesas tales como: Caoba, Cedro, Acana-Caguairan y otras.

Además se desarrolla el cultivo de café (no es toda la - región), del Cacao, también se cultiva el Plátano y pag tos artificiales para el ganado.

Es importante señalar el desarrollo que tiene la industria de artesanía y otras esferas de las Industrias Locales.

2.6. Vias de comunicaciones.

El desarrollo alcanzado en esta región en lo referente a vías de comunicaciones es significativo pues recordamos que al triunfar la Revolución Baracoa no tenía comunicación terrestre, tampoco aérea con el resto del territorio Nacional aunque tenía un servicio de cabotaje costero poco desarrollado.

La principal vía de comunicación terrestre es "El Viaducto la Farola" que une a Baracoa con la ciudad de Guantánamo, capital Provincial. Además esta el terraphen
Moa-Baracoa que será ampliado y pavimentado en el próxi
me quinquenio y la carretera que une a los poblados Con
solación, la Gotera y Jamal con Baracoa, así como tam bién ha carretera que enlaza a Sahana y otros pobladoscon Baracoa.

Existe gran cantidad de caminos rurales que aseguran las posibilidades y una mayor comunicación local de la región.

Baracoa cuenta con comunicación aérea con la Hahana y - Guantánamo mediante vuelos regulares y aviones Yak-40 - también con el poblado de Maisí empleando avionetas - An-2. Su transporte marítimo está bastante desarrollado, pues constituye una principal vía para recibir y expertar mercancía a otros puntos del territorio Nacional.

CAPITULO No. 3

Historia de las investigaciones anteriores.

Introducción.

Para la elaberación de este capítulo se tomó como base bibliográfica fundamental la tarea "Recopilación Bibliográfica del Tema" Análisis-Estructural del Macizo Mayarí-Baracoa" desarrollado entre el ISMM (Deto de Geología) y el C.I.G.

Por la característica del material bibliográfico consultado el capítulo es dividido en tres espígrafes para su mejor estudio esto son: investigaciones geológica, geomorfológicas y los trabajos de búsqueda y exploración:

3.1. Estudios Geológicos Regionales del territorio Mayari-Baracea.

De la etapa de la pseudorepública merece ser visitado el trabaje de Keijzer en 1945, el cual se limita a breves reportes geclógicos de marchas de reconocimiento.

Con el triunfo revolucionario se crean las condiciones para de sarrollar las investigaciones geológicas sistemáticas dirigidas a esclarecer de forma integral las estructuras geológicas, su - estratigrafía y posibilidades de diversos recursos minerales. Entre 1960-1961 los geologos seviéticos A. Adamovich y V.Chejovi vich efectuaron un trabajo de carácter regional elaborando unmapa geológico a escala 1:250 000 en base a interpretaciones fo togeológicas y marchas de reconocimientos geológico, limibante-en dicho mapa por vez primera para el territorio Mayarí-Baracea la corteza de intemperísmo p además de establecidas la secuencia estratigráfica y en cuanto a estructura geológica considerar la existencia de un zócalo metamorfico de edad Jurásico, sobre el cual se depositaron secuencia volcánicas durante el Cretásico Superior el territorio fue intensamente erosionado crean dose un relieve montañoso muy diseccionado.

En el Maestrichtiano se produce un rápida subsidencia y sobre - el relieve y regular se inicia la acumulación de conglomerados- y brechas, todo esto derivado de la erosión de las rocas ultrabásicas, para luego depositarse dedimentos terrígenos, calcáreos y localmente volcánicos del Paleógeno y finalmente sedimentos - del Neógeno.

Las investigaciones posteriores aportaron 3 elementos que han - ocasionado un salto cualitativo del grado de conocimiento geológico estos son:

- a) Existencia de fuertes movimientos de sobreempuje que provocan la intercalación de secuencias alóctonas y autóctonas.
- b) Emplazamiento de cuerpos serpentiníticos en forma de mantes tectónicos alóctonos.
- c) Que los conglomerados y brechas de edad Maestrichtiana poseen carácter sin-orogénico relacionado con los movientos de empla zamiento de los cuerpos de serpentinitas.

In 1968 Knipper y Cabrera sobre la base de observaciones decampo y revisión de materiales existentes plantearon que los cuerpos de serpentinitas representan fragmentos de certeza eoceánica que se han deslizados por los planos de fallas profundas hasta la superficie donde se han emplado en forma de mantes tectónicos sobre la superficie.

Estos trabajos fueron publicados en 1974, los trabajos J.Cobig lla y F. Quintas (1978) y el levantamiento geológico 1:250000 del Instituto de Geología de la Acedemia de Ciencias de Cuba-(1957) que constituyen los trabajos fundamentales en cuanto a geología regional en el territorio Mayarí-Baracoa, los cuales han aportado nuevas ideas. A este múcleo principal se suman los trabajos de búsqueda y exploración Wi.Co.Cr etc. que harconstribuido a elevar el grado de conocimiento de la región.

en 1972 profundizando en la idea de Knipper y Cabrera estable ciendo que la tectónica de sobre empuje afecta también a la secuencia sedimentataria dislocada fuertemente y detectaron-la presencia de mantos tectónicos en numerosas localidades constituído por rocas terrigenas y volcánicas de Cretásico Superior yaciendo sobre secuencias terrigenas del Maestrich tiano-Paleoceno Inferior. Además de observar el carácter alóg tono de los conglomerados brecha de la formación Picota, demuestran con abundante prueba que son formaciones sin-orogénica que ocupan la base de los mantos serpentiníticos. Hecho que indica el desarrollo de las cortezas de intemperísmo favorable.

En 1978 Cobiella propone la diferenciación en Cuba Orientalde 4 grandes estructuras.

- 1. Anticlinorio Sierra Maestra.
 - 2. " Oriental
- 3. Sinclinorio Oriental
- 4. Guenca Nipe- Baracoa

De estas estructuras el territorio Mayarí-Baracoa comprende -las estructuras Anticlinorio Oriental y Cuenca Nipe-Baracoa.

Hasta el momento actual se conoce desde el punto de vista geo lógico regional que el territorio Mayarí-Baracoa presenta uma estructura geológica compleja, notables sobreempujes de mantos de hiperbasitas serpentinizada de edad Maestrichtiano tardio-y Paleoceno, datos demostrado porque las formaciones más jóvenes cabalgadas son de edad Maestrichtiano y las secuencias-más antiguas compuestas por margas y calizas de edad Ecceno - Inferior.

MONTHUN T

3.2. Investigaciones Geomorfológicas.

A. Adamovich y V. Chejovich en 1963 efectuaron algunas observaciones geomorfológicas en el territorio de Mayarí-Baracoa para esclarecer las regularidades de la distribución de las cortezas ferroniquilíferas asignandole como edad de formación Pliaceno-Cuater nario (N2 - Q). Establecieron la existencia de una serie de escalones que descendían desde la divisoria principal de las aguas hasta la costa Atlántica, relacionando con estas la calidad y los espesores de las cortezas notandose que en los niveles intermedios de 80-600m se acumulan los mayores espesores.

Otras investigaciones temáticas han sido desarrollada por Formell Buguelshi y otros. Desde 1974 el ISMM en colaboración con las Ampresas Geológicas ha realizado trabajos dirigidos a determinar las regularidades más importantes del relieve que controlan la distribución de los despósitos de cortezas además de las posibilidades de conservación y acumulaciónes de lavado y transporte.

El primer trabajo donde se aplicó un complejo de investigacionesgeologo-geomorfológicas fue en el yacimiento Martí de Nicaro donde a escala 1:10 000 se estudiaron las formas tectónico-denudativas del relieve, realizando el mapa de distribución de pendientesse demostró la estrecha relación que existe entre los espesores de los depósitos de cortezas ferroniquelíferas con el grado de pendiente y el nivel hipsométrico de las superficies aplanadas.

En 1980 se realizó un trabajo similar que abarcastedo el minicipio Mea a escala 1:50 000 aplicandose diferentes métodos morfométri—cos y fetogeológicos para clasificar todos los depósitos en grado—de perspectividad.

3.3. Estado actual de la Búsqueda y Exploración.

El territorio Mayarí-Baracoa ha sido unvestigado con fines de búsqueda de yacimientos de Ni y Co en casi toda su totalidad siendo evaluada un gran % de las áreas de desarrollo de las -cortezas. Aunque el país cuenta con reservas suficientes -para cubrir las necesidades de las plantas en producción y -las proyectadas para el decemo 1980-1990, aún se requiere ele var el grado de conocimiento de las minas con el fin de organizar un sistema de exploración más racional.

En 1979 en el ISMM Moa fue discutida una tesis en opción al grado de Candidato a Doctor por el Licenciado Grabiel García
C. bajo el título "Regularidades de la distribución de las cortezas de intemperísmo ferromiquelfferas en los macizos ser
pentiníticos de Cuba, como base de los trabajos de búsqueday exploración de los yacimientos de Ni y Co" se senalan las deficiencia en el complejo de métodos tradicionales de investigación tales como:

- 1. Carencia de mapas geológicos, detallados 1:10 000
- 2. Las investigaciones geomorfológicas de obligatorio empleo en la búsqueda preliminar y detallada no se incluyen en los proyectos técnicos de búsqueda.
- 3. Estudio deficiente de las condiciones hidrogeológicas locales.

CAPITULO Nº4

Metodología usada en las investigaciones.-

El métode morfemétrice-Cartográfico surge a partir de los - dates obtenidos de la elaboración de los mapas tepográficos e fetos aéreas, Las primeras tentativas las efectúa S.S. Subúllev, para estas cobraron notable desarrollo en los trabajos de U.P.Filesúfov, quien lo aplicó a la prespección de las elevaciones locales gaso-petrolíferas en perspectivas (V.E.Jain Nº6).

En Cuba estos métodos han sido aplicados en la búsqueda de petróleo y gas, yacimientos de sulfubes al NW de Pinar del Río así como para el estudio y prenóstico de las cortezasde intemperísmo ferroniquelíferas lo cual confirma la estre
cha relación que existe entre las diversas formas del relie
ve y los yacimientos a estas asociados.

Ofreceremos ahora una breve explicación de la metodología - empleada en la ejecución de los diversos anexos gráficos.

Mapas de Pendientes.

Para la elaboración de estas nos apoyamos en los mapas topo gráficos a escala 1:50 000 en los cuales separamos las áreas con similar comportamiento de las curvas de nivel, luego me dimos el valor de 2 (distancia horizontal entre 2 ptos) para cada área, asignandoles el rango de pendiente correspondien te a cada valor de 2.(Anexo 3)

Mapas de Isubasitas.

Para confeccionar los mapas de isobasitas fue necesario trazar el mapa de ordenes de los ríos. Luego procedimos a la - elaboración de los mapas de isobasitas desarrollados para - las 2da, 3ro, 4to y 5to órden por separado.

Para el trazado de estes mapas marcames les puntes de inter sección de las curvas de nivel con les ríos del órden en que deseamoso confeccionar el mapa de superficie básica, luegode tener tedo les puntes indicados, se unen per iselíneas los de igual valor. Obteniendose así los mapas de isobase.

Mapas de diferencias de Isohasitas.

Estos mapas & obtiene cuando se superponen dos mapas de 4isobasitas de diferentes ordenes, marcando Los puntos donde las isobases de diferentés para posteriormente unir los puntos de igual valor por istlíneas, Siempre de la de menor orden a - de mayor orden (Ejmplo 2do, 4to).

Mapas de dirección vertical y horizontal.

Para la confección de los mapas de dirección horizontal calculamos para diferentes sectores el coeficiente de esosión lateral, que no es más que la longitud de los cursos fluviales en el área considerada.

La dirección vertical se obtiene de la diferencia entre la come ta máxima y la mínima en un km².

Tanto la dirección vertical como la horizontal se expresa en - KW-1.

Mapas de relieve residual.

Se confeccionaron a partir de los mapas topográficos a escalas 1:50 000 en los cuales se señalaron las curvas de nivel que se na curva de nivel — de las que se cierran.

La metodología de las investigaciones geólogo-geomorfogógicos fue efectuar un estudio de todos los materiales bibliográfi

cos aunque tomamos como base fundamental el informe del levantamiento de la Brigada Cubano-Hungara del cual extraimos la información necesaria para desarrollar la Geología regional posterormente aplicando los método morfométricos elaboramos los
mapas dependientes, Isobacitas y relieve residual, teniendo como material básico las cartas topográficas desarrollando un
amálisis de cada uno. Tomando como base el mapa Geológico.

tambien adoptado del informe de la Brigada Cubano- Húngara y
usando llos mapas dependientes efectuamos la zonación la cual
describimos en el capitulo No6.

Finalmente elaberames les mapas pronéstice que dan una valoración de las cortezas de intemperismo de acuerdo a su perspectividad. CAPITULO No. V
GEOLOGIA REGIONAL

INTRODUCCION

En este estudiamos varios epígrafes. En lo referente a - estratigrafía desarrollamos en orden cronológico las des - cripciones de todas las formaciones geológicas que afloran-nuestra región de trabajo. Además elaboramos los epígrafes-dedicados al magmatismo y a la Tectónica.

Se incluyen dentre del presente capítule, el epígrafe corres pendiente a cortezas de intemperismo dende se señalan varies aspectes, entre elles las zonas de desarrelle de estascertezas en Cuba y también la influencia de les mevimientes neetectónicos en la región.

5-1 ESTRATIONAFIA

En nuestra región de estudio se encuentran presente rocas - sedimentarias, rocas vulcanógenas- sedimentarias, rocas intrusivas y rocas metamórficas. Ahora pasamos a la descrip - ción de cada formación geológicas

FORMACION LA FAROLA (PRE-MAESTRICHTIANO)

Sus autores son D.P Coutin y P.Gyarmeti 1976. Presenta si - nonimia con "El Complejo Basal" muy conocido en la litera - tura geológica cubana o el Complejo Vulcanogeno- Eugeosin - clinal (Somin y Millán 1976)

Esta cubre un área de 1000-11000 Km² en la sierra del Purial, estando limitada al norte por el rio Jaguaní, al Oeste está limitada por el rio Sabanalamar, al sur por una estrecha franja costera donde afloran formaciones más jovenes y al Este por una línea trazada entre vertiente y Jaúco. Los mejores afloramientos de esta se enchentran a lo largo del-Baso las Guásimas-La Farola.

En la carretera Vía Azul se observan una serie de esquistos verdes y esquistos cleríticos-sericíticos verdaderamente te rrigeno que estan fuertemente plegados y fracturados.

Una serie de muestras representan el Complejo eugeosincli nal debilmente metamorfizados. El grado de metamorfismo esdesigual, existen las muestras que estan solo alteradas y estan las verdaderamente metamorfizadas que se ubican en los alrededores del río Toa.

FORMACION BUCUEY (Cretácico inferior- Cretácico Superior)

Esta fué propuesta por D.P. Coutin, 1976. Se extiende desde la Cuenca la Burra hasta la zona de Baracoa tanto al Nortecomo al Sur de las Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa. La mis ma está compuesta por tobas, lavas y aglomerados en cantida des subordinadas. También aparecen pequeños cuerpos de ande sitas, diabasa y porfidos dioríticos. Como rocas sedimentarias encontramos pequeños lentes de conglomerados y horizon tes poco potentes de calizas.

En esta formación se incluyen las calizas pizarresas finamente laminadas de color grisáseo, designadas por Adamovich

y Chejovich, (1963) al Cretásico inferior las cuales no tienen datos faunísticos. Estas calizas se diferencian como el Miembro Barrederas, localizadas al Este del poblado de -Tánamo.

Las tebas ecupan más del 50 % del tetal de la fermación, alpareser preferentemente en la parte superior, las varieda des más comunes son vitroclásticas y cristalovitroclásticas
Son de granos finos y medios, estando en ocasiones silicificadas.

Es característico para las tobas el color parduzco, grisáseo carmeliteso, indice de haber estado sometidas a un intenso-intemperismo.

Las lavas aparesen frecuentemente en esta formación, no existiendo buenas descripciones petrográficas y análisis - químicos, producto al alto grado de intemperismo que presen - tan dado per su color carmelitoso, gris escuro, exidado, en general de fácil fractura. Predominando en ellas las variedades perfiríticas que aparecen como mantos estratificados-concordantes con las tobas.

Es frecuente encontrar junto con las lavas, horizontes de - aglomerados, su composición oscila entre dacítica ó andecítica.

Discordantes sobre esta formación yacen las formaciones: - Castille de los Indios, Charco Redondo y la Picota. La po - tencia de esta formación es de 2100 m apróximadamente.

FORMACION LA PIGOTA (Campaniano- Maestrichtiane)

Sus autores fueron G.E.Lewis y J.A. Straxzek, (1955) y - redescrita per K. Brezsnyansky y P. Jakus en (1976.

Aparesen les flances meridienales de la Sierras de Nipe y - Sierra Cristal, en la Cuenca de Sagua de Taname y aisladamente en la Sierra de Baracea a le large del Bío Vúmurí.

Esta compuesta por conglomerados polimícticos y conglomerado- Brecha, a menudo mal seleccionado con intercalaciones de areniscas y lutitas. El color de la matriz y las clastos es rojizo ó abigarrado en dependencia de la metorización. El material clástico del conglomerado se compone de rocas - vulcanógenas, lavas, tobas, dioritas, gabros, serpentinitas- y subordinadamente calizas. Este material está mal seleccionado presentando pequeños lentes de arenisca angulosos y sub angulosos.

En algunas zonas esta se compone de ultrabasítas serpentinizadas con diferentes grado de alteración, además se puede ob servar clástes de rocas básicas que acompañan a los cuerposultramáficos, gabros y piromenitas.

La matriz es arenesa, gravelítica y menes frecuente arcillosa.

MIEMBRO MICARA (Formación la Picota).

Propuesto por J. Cobiella en 1973. Se extiende por la partemeridional de la Sierra de Cristal y por la depresión de Sagua de Tánamo.

Su litología la integran areniscas y alcurelitas con interca laciones de conglomerados y raras veces calizas dolometiza - das.

Las areniscas y alternandose a carmelita.

Las areniscas sen mesemícticas compuestas per fragmentes redendeade poce seleccionade de recas efusivas, calizas y cuar
ze. Las aleurolitas sen de celer gris compuesta de granes de
plagieclases, cuarze y calcitas sus centactes cen las arenis
cas sen brusces, eresives con endulaciones.

Las intercalaciones conglomerados estan constituidas por material vulcanógeno, dierítico y a veces serpentinitas.

La fermación la Piceta yace discordatemente sebre la ferma - ción Bucuey y en algunas partes sebre los cuerpes ultramáficos. Tiene una petencia de 1000 m, de los cuales 250-500 m - pertenesen al conglomerado.

FORMACION CASTILLO DE LOS INDIOS (Excene Superior).

Fue propuesta por D-P. Coutín (1976). Se extiende en forma de una faja estrecha a le large de la cesta Noreste Oriental desde Cayo Guín al Este de la Ciudad de Baracea hasta la ser canía de Levisa al Oeste. Su anche premedio és de 1 km.

Esta constituida per tebas ácidas con predominio de las va - riedades vitrioclásticas y litevitrioclásticas, con estratos de un espesor de 25 cm apróximadamente, siendo los gragmen - tos de mediano y pequeño tamaño los más abundantes dentro de estos. Amplia distribución en esta formación presentan las - calizas, margas, tufitas y aleurolitas de grano fino, color-blancuzco amarillento, yblancuzco grisaseo.

Hay áreas dende las recas calcáreas (calizas, margas, tufitas) predeminan sobre las tebas.

Las relaciones tectónicas de la formación con las serpentinitas están determinadas per mevimientos Post-Capiro que eriginaren sistema de fallas algunes de los cuales ecacionarengrandes desplazamientos considerables de los bloques serpentinisticos. Además de conglemerado basal convertido en brecha tectónica milonitizada, se observan zonas de transiciónentre las serpentinitas y las tobas.

Esta formación yace descordantemente sobre las ultrabasitasen la zona oriental y además concordantemente sobre la forma ción Gran Tierra hacia el extremo occidental, estando sobre yacida concordantemente por la formación Capiro (Eoceno Superior) y con ligera discordancia por las calizas de la for mación Puerto Boniato (Eoceno Medio). Su potencia máxima es de 2500 m aunque los espesores observados no exceden de -60 m.

FORMACION CAPIRO (Becene Superier)

Propuesta por K. Brezsnyanszky y E. Naggy (1976).

Aflora entre el rio Miel y la Bahía de Mata ubicandose su localidad tipo al sur de Sierra de Capiro. Es una secuenciaaleurolítica calcárea, micacea 9, estratificada de color par
de tipo " Sehlier ". Secuencia muy uniforme, sin cambio lito
lógico horizontales 6 verticales . Hay bioglífes y fragmentos
de plantas carbonizadas. Depósito Lagumar- Marino.

Esta nace concerdantemente sobre la formación Castillo de los Indios . En un punto representa paso gradual . Sobreyacida por la formación Cabacú.

Presenta un espesor de 200 - 300 m

FORMACION CABACU (Oligocene Superior- Miecene Inferior)
Sus autores son K. Brezsnyansky y E. Naggy (1976).

Aflera al Sureste de Baracea en el poblado de Cabacú (loca - lidad tipo). Fermada per conglemerados mal estratificades-con estratificación cruzada y lenticular, de matriz arenesade celer gris pardo. Clastes redendeado de ultrabasitas, lavas y tufitas exidadas, gabres y aleurolítas de la fermación Capiro.

Su edad ha side propuesta sin argumentación paleentelógica - 6 estratigráfica.

FORMACION YATERA (Oligocene Superior- Miecene)

Descrita per M.T. Kezary (1955) y redescrita per E. Naggyv G.L. France y Gy. Gyarmati en 1976.

Esta formación se extiende en parte formande una faja entreel rio Bayate y la Sierra del Comvento, integrando el zócalo de la superficio de nivelación entre los 400-575 m.

En la base está constituida por aleurolitas de color gris - claro sin estratificación y son sobre corridas por un espe - sor de 25 cm de calizas biógenas duras de color carmelitose- a rosáseo indefinido, que tienen abundante fauna de lepidoci clina presentando una estratificación grosefa. El carso es - tá muy desarrollado.

FORMACION CABO CRUZ (Miecene Medio- Pliocene)

Descrita per M.T. Kezary (1956) y redescrita per G.L. France en 1976.

Aflera en diferente zonas de Cabo Cruz y Punta de Maisi.Franco la divide en dos miembros; Rio Ruevo y Rolando.

Esta pesee una yacencia suave de las recas, la estratifica - ción mal definida. Yace discordantemente sobre la formación-Limones y el miembro Pilen. En Maisí sobreyacen las formaciones Chafarina y Cabacú. Es sobreyacida per la formación maquey su espesor es posible que alcance más de 200 m en El Sureste del Gelfo de Guacanayabo.

MIEMBRO ROLANDO (De la Formación Cabo Cruz)

Descrita per G.L. France (1976). Su parte baja la integran conglomerados calcáreos, matriz arenosa-margosa muy fosilífe ras clástos de calizas de 3-6 cm. Cree que puede ser un conglomerado basal.

Más arriba yacen gravelitas con clástos de caliza con una petencia de 8 m. Más arriba yacen calizas organodetrítica- margosas en capas de 20-30 cm con intercalaciones de conglomerado y calcarenitas. Yace discordantemente sobre Limones.

Cubre concordantemente al miembro Rebarcadero de la forma - ción Manzanillo (que es del Mioceno Medio). Sobreyacida - por el miembro rio Nuevo. Su petencia es de 10m .

MIEMBRO RIO NUEVO (De la Fermación Cabo Cruz) (Miecene Medie Pliocene)

Descrita por G.L. France, N.Pérez y J. Ore, (1976). Aflera en Cabe Cruz y Maisí. En la base (Estrate)afleran margas - con nédulos calcárees, Kuphies y Semites y fragmente de cera les aparentemente de especies actuales. Más arriba yacen gravelitas calcáreas con tubes de teredos. Clastos subredondeados y subanguloses. Su matriz puede predominar respecto a - los clastos. Más arriba yacen calizas organodetriticas-arcillosas con melde de meluscos.

La unidad es sebreyacida per la formación Matas. Tiene un - espeser de 60 m

FORMACION BARACOA (Miecene Superior?- Pliecene)

Descrita per G.B. Frace (1976). Afleramiente pimitade Baracea. Estando su localidad tipo en un escarpe de la ciudad de Baracea. La base del escarpe es una ventana erosional donde-afleran arcillas calcáreas de celor amarillente parduzca con nedulos calcáreos y fragmente de cerales. Presentan intercallaciones de caliza erganedetritica, compacta. La Estratifica ción es escura. Probablemente yace discordante sobre la formación Castillo de los Indies y sobre ella yace la formación Maya (Probablemente discordante)

PORMACION MAYA (Plieces- Bleistecene)

Propuesta per (.L. France (1976) - Aflera desde la Bahía de-Tace- redea la zena de Maisí y la costa Sur hasta Cabe Cruzen afleramiento intermitentes.

Esta fermación presenta en su composición calizas ceralinascompuestas, recristalizadas, carsificadas, a veces aporcelanadas de colores entre blanco y resade. La fauna en generalestá recristalizada.

FORMACION VARADERO (Helecene)

Aparece como extensos depósitos de arenas sueltas miogéni - cas de grano fino calor blanco amarillento compuesta casi - exclusivamente por carbonato. El aporte terrígeno es varia- do según el desplazamiento, dando lugar entonces a varias - coloraciones.

FORMACION JAIMANITA (Pleistoceno)

Fue descrita per G.Bredermann, (1943) y redescrita per - G. France en 1976. Su localidad tipo es Jaimanita en Giudad Habana.

Compuesta por calizas organodetriticas masíva, algo caverno sas de color amarillo, con intercalaciones de calcarenitas. Fauna abundante de corales y moluscos contemporáneos. Estra tificación mal definida, yacencia horizontal.

En Cuba oriental se distinguen les miembres Punta de Mengey Terguilla. Ambes propuestes por G-L. France (1976)

MIEMBRO PUNTA DE MONJE.

Aflera en la franja cestera entre rio Las Puercas y Punta - de Menje. Compueste per conglomerados y gravelitas escuras. Clastes bien redendezdo mederadamente seleccionado de calizas, tufitas, lavas básicas y calcedónea con diámetro medio de 3-5 cm.

FORMACION JUTIA (Helecene, per pesición estatigráfica)

Ssus autores son L. Korpás y Gy. Radoez (1976). Se extieme de por las Bahías y otras partes de las costas donde predominan los manglafes y zonas pantenosas. Su localidad tipo - es Laguna Jutía en la desembocadura del Cauto.

Esta formación esta compuesta por sedimentos clásticos no - consolidados, aleurolitas calcáreas y organodetrítica, are- na margosa y arcillosa a veces gravas finas .

Estas zonas periféricas suelen presentar granos de sal. FORMACION RIO MACIO (Helocene, per pesición estratigráfica

Propuesta E. Naggy y Gy. Radeez 4 1976). Sen depésites 4 de les cauces y erillas de les ries. Su localidad tipe es - el Rio Macio al Sur de la Sierra Maestra dendé se observansedimente aluviales comptestes per bloques, canto redades - arenas, aleurolitas y arcillas. En etras áreas características sen más ó menes similares presenta petencia de 1-2 m

Más arriba yacen biocalcarenitas cruzadas poco porosas de - color amarillo, lateralmente pasan a depósitos más gruesos - con algunos corales en posición de crecimiento. Contiene bue na fauna de meluscos y fragmento de corales. Estratificación oscura, yacencia horizontal.

MIEMBRO TORTUGUILLA (Pleistoceno Superior)

Aflera en numerosas regiones costera de Cuba eriental su localidad tipo es la Blaya Tertuguilla. En la base presenta calciniditas groseras, biogénicas, color blanco amarillentofragmento de corales también aparecen calcarenitas tipo beaach rocks con muchos moluscos. Petencia de 10-15 m.

5.2 Tecténica

Para Cuba Oriental se han efectuado varias proposiciones de tequemas tectónicos entre los cuales tenemos.—
les propuestes per C.M Judeley (1964); Puscharovsky, —
Knipper y Puig en 1967 plantean etre esquema basado en
las principales estructuras geológicas del Territorio—
Nacional.

En el período comprendido entre 1972-1976 es desarro - llado un trabajo por ula brigada Cubano-Hungara que ha ce una zonación estructurofacial de lo que constituye - la antigua Provincia Oriente, diferenciando las siguien tes zonas estructurofaciales:

- 1- Zona Caimán
- 2- Zona Remedies
- 3- Zona Tunas
- 4- Zonas Auras
- 5- Zona de las Sierras Nipe-Cristal-Baracoa

La Zona Caimán coincidió con la zona Cauto en la Literatura. Las zonas Auras, Tunas y Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa representan la zona Zaza descrita por --otros autores.

Estas cinco zonas se cubren per las siguientes estructuras superpuestas:

- a) Cuenca de Guacanayabe-Nipe
- b) Cuenca de Guantánamo
- c) Sinclinerium Central
- d) Franjas transgresivas literales

La zona estructurofacial a la cual pertenece nuestra región de trabajo (según el esquema tectónico de la -Brigada Cubano-Húngara) es la zona de la Sierra Nipe Cristal-Baraçoa. Esta abarca el territorio de las Sierras de NiperSierra Cristal y la Sierra Sagua-Baracoa,
incluyendo también la Sierra del Purial, además de las
depresiones intramontañosas y marginales de la misma.

La estructura de esta zona está caracterizada por ble—
ques hundidos (gravenes) y bloques emergidos (hérticos)
entre un sistema de fallas antiguas orientadas en las —
mayorías de los casos Norceste — Sureste y Noreste — —
Suroeste .

La subdivisión en bleque de esta zona se le asigna el haberse inciado en la fase larámica, contemperanáneamente con la formación de nappes de ultramafitas.

La litofases mas característica que se observan son: metamorfitas regionales, ultrabasitas con enormes cuerpos de ga bros y una secuencia vulcanogena.

5.3 Magmatismo.

Las recas magmàticas peseen grandes desarrelle en el representadas principalmente porrecas àltrabàsicas y recas bàsicas ecupande una extensión de varies kilómetres, Su estudio es impertandte per su relación cen les
yacimientes de Fe, Ni, Ce, Cr, étc.

En el desarrollo ideològico de la región Nipe - Bara-coa tienen una papel predominante, constituyen más del e 70 % y forman las partes principales de las Sierras Nipe - Cristal - Baracoa, su extensión es de 180 km o más y un ancho de 30 km. Es el mayor cuerpo de Cuba en el cual según Adamevich y Chejovich (1963 - 1964) es un la colito magnático que yace casihorizontal y que forma parte de la gran faja ultrabásica de Cuba que se extien de a lo largo de la sosta Norte de Cuba por más de - 1000 km con interrupciones (Brigada Cubana-Hungara No-3)

En la composición de los masisos ultrabásicos de acuerde a la mayería de los auteres tenemos; peridoditas —
(harzburguitas y lherzalitas fundamentalmente), pirexe
nitas y dunitas. La estructura interna de los ultrabási
tas es como de grandes bloques que su tamaño puede variar desde l - 2 M y 10 - 15 Kms, su distribución dentro del maciso no guarda una regularidad especial.

Algo que subbraya la estructura en bloque a nuestro criterio (Knipper A.L. y R. Cabrera)(7). es la presencia - de inclusiones de las formaciones metamérficas, gabros-y de las rocas vulcanógenas del autóctono hecho demostrado por Adamovich et al, (1963) al hallar dentro de - las sepentinistas inclusiones de rocas metamérficas - (exquistos y amfibelita).

Como resultado del metaforfismo se desarrollan estos ma cizos ultrabásicos la serpentimazación, pero no uniformemente, más generalmente está desarrollada en los bordes, sobre todo en límites téctónicos de sobrecorrimiento de éstas sobre recas autóctonas. Les macises ultrabásicos de esta región están intruides per cuerpos de gabres que han sido estudiados per diverses autores que consideran su relación con las recas ultrabásicaspor pasos graduales, sin embargo Adamovich y Chejovich — (1963) vinculan éstes con la segunda fase del complejo — instrusivo del Cretácico Superior, estableciendo que los — cuerpos de gabroides se enmarquen en la zona de grandes diglo caciones y tienen contacto tectónico con las recas ultrabásicas.

5.4 Certeza de Intemperisme.

Su estudio constituye una tarea importante en el desarrollo económico del país dada su relación con los yacimientos: Fe,Ni,Co y Cr.

A le large de teda Cuba se extiende una faja de reca zultrabásica sepentenizada de forma discentinua que forma parte de un cinturón de recas intrusivas, que se extiende desde Guatemala hasta les Andes a una distancia mayer de les 1000 Kms.

Esta faja de recas ultrabásicas conecidas en Cuba ceme Cinturón Hiperbasítico dende las serpentinitas se encuentran emplazadas en forma de bloques tectónicos se hallan vinculadas las cortezas de intemperismo.

La formación de la corteza de inetemperismo ferroni quelíferas estan asociadas a la interrupción continental prolongada en condiciones de peniplanización del del relieve, la edad de inicio de su formación es a partir del Pliecene, proceso que aún continua per exis tir las condiciones geológicas y geomerfelógicas para? su formación.

El perfil completo de estas cortezas de abaje hacia — arriba estan representados por 5 zonas minerales, és— tas son:

- Serpentinitas carbonatizadas desintegradas
- Serpentinitas lixiviadas
- Serpentinitas nentrenitizadas
- Ocres desarrellades per las serpentinitas.

Zonas de desintegración

El horizonte interior de éstas lo forman rocas serpentiníticas casi inalteradas químicamente pero intensamente agridadas. La serpentinita carbonatizada sustitu yen de forma paulatina a la rocas del horizonte inferior. La carbonatización se observa en forma de vetillas de intensidades variables.

El carbonato más desarrollado es la calcita, con menes frecuencia la magnecita y la cerolita.

La petencia de esta zona de de 50 M.

Zona de lixiviación.

Constituida por las serpentinitas carbonatizadas y cerelitizadas, a menudo ecretizadas y nontronitizada debilmente. La carbonatización y la cerelitación se diferencian de la existente en la zona inferior por la presencia amplia de cerelita de diferentes matices. El espesor promedio de esta zona es de $1-1.5\,\mathrm{m}$.

Zona de serpentinita nontronitizadas.

Su herizente interier de 1 - 2 m le forman serpentinitas - nentrenitizadas desarrelladas en forma de bandas lineales-cen rumbe ceincidente cen la disección de las pequeñas cerrientes de agua.

Sebre este horizonte y como componente de la zona yace la parte basal del paquete ecrose Serpentinítica que por su - composición química, mineralógica y granulométrica, presenta anología con las serpentinitas nontronitizadas.

El erigen de este paquete es producto de la mezcla mecánica de perdigón y serpentinitas con grados diferentes de in temperismo distribuidas de forma irregular entre el material ocroso. La potencia de la zona es de 1 - 5 m.

Zona de los Ocres

La misma está representadas por las variadades ferruginosas - estructurales y no estructurales desarrolladas por las serpentinitas friables,

Los ocres estructurales son formaciones homogénicas de tex tura fina y color amarillo, destacandose en el fondo segre gaciones porfíricas pardo rojizas de bastita completamente ocretizada.

Los socres inestructurales yacen sobre las variades estructurales y están representadas per ocres areilloses y terrenes mezclados con concreciones de forma de granalla.

En Cuba se pueden hubicar 3 zenas de desarrelle de cortezas de intemperisme señaladas por Ariosa Iznaga J.(Ne2). - que sen:

- a) Límites de la Meseta de Cajálbana (Bahía Honda, Pinar del Río).
 - b) Meseta de San Felipe (Camagüey)
- c) Costa Norte de la parte oriental de Cuba, dende se obvan 3 grandes áreas:
 - Pinares de Mayari
 - Nicare
 - Moa Baracoa.

5.5. Caracterización cualitativa de los movimientes Neotectónicos que han afectado la región.

Les estudies neetecténices de ésta han cerroborado quedurante toda la fermación y desarrello de la certeza terrestre incluse en les mementes actuales ne ha ecurride en ésta període de inactividad techenica (Jain-V.E No.6).

V.E. Jain clasifica les mevimientes nectectonices en - des tipes:

- Contemporanees e actuales (ecurrides en les últimes-6000añes).
- Modernes o recientes (ocurridos del Mieceno Pleisteceno).

Para el estudio de los indicadores que denotan la presencia de estos movimientes neotectónicos nos apoyamos fundamentalmente en los métodos geomorfológicos de --dado por los mapas topográficos, mapas de isobasitas y de diferencias de isobasitas.

A partir del estudio de las cartas topográficas en ——
nuestra región se puedieron determinar algunes indicios
geomorfológico de los movimientos contemporáneos y novismos (VeE. Jain No.6) tales como:

- Cambio bruscos en la dirección de los ríos.
- Tramo recto de los curpos fluviales, indicadores defractura.
- Cursos que contornean las elevaciones.
- Disposición de los afluentes en una sola línea.
- Meandres bruscamente acedades.
- Terrazas fluviales y marinas ampliamente distribuidas en la región de estudio.
- Dislocaciones de las frecuencias cuaternarias

Estos movimientos neotechónicos no han sido centinuos en el tiempo, pués han existido períodos de gran ines batabilidad téctónica y período de estabilidad téctónica que han permitido la formación de superficies aplanadas y de las terrazas fluviales. Teniendo en cuenta los indicios geomorfológicos antes formulados es posible plantear que los movimientos techonicos recientes en nuestra área de estudio se manifiesta con mayor intensidad en la parte sur y en la perción nereriental fundamentalmente.

CAPITULO Nº 6 ..-

Características Geomorfológicas Regionales.

Introducción .-

En este capítulo considerado por nosotros como el más complejo por la cantidad de tiempo dedicado al mismo, fue elaborado tomando como base los mapas topográficos y los mapas dependientes. Durante el desarrollo del mismo se expliva el comportamiento — de cada uno de los carácteres geomorfológicos empleados, paraposteriormente realizar la zonación geomorfológica donde cadazona es descrita de forma particular indicándose los valores— promedios que presentan la disección vertical y horizontal, lo gangos dependientes, además de subtrato rocoso sobre el cualse desarrolla y los tipos de depósitos que podemos encontrar — en la misma;

6.1. Características geomorfológicas de la región.

Las condiciones geomorfológicas son criterios básicos en el estudio y prospección de la corteza de intemperísmo porque sus perpectividades dependen del relieve, por tal razón la impulsión de las investigaciones geomorfológicas es importante.

Este epigrafe ha poseido como base para su elaboración la tarta topográfica de nuestra región de estudio a escala 1: 50 000.

El reliève en nuestra área presenta en zona aledaña a la — conta desarrollo de llanuras consteras y algunos sistemas — de terraza marina, para posteriormente transicionar a zonas montañosas muy disencionadas que corresponden a las Cuchillas del Toa y finalmente la zona montañosa correspondiente a — Sierra del Purial denda las mayores cotas teman valores — entre (800-1000m), aquí es donde se ubica la superficie divisoria de aguas principales en zona desmembrada en niveles hipsométricos mayores de 600m. La disección vertical — arroja valores de 0.390km⁻¹ que es el más elevado en la región de trabajo.

En algunos sectores de las áreas mentañesas, se observa desarrollo de superficies aplanadas en divisorias de aguas -principales compendiente de 0-5°.

Los depósitos más característicos en toda la región son los eluviales y los deluviales- eluviales.

La red de deenaje fluvial muestra notable desarrollo observandose una tendencia general de los cursos fluviales de — 5to y 6to 6rden de presentar una orientación Suroeste-Nor-éste, en cambio los de 1er 6rden no poseen una dirección de finida.

También debemos señalar la presencia en el área de Sabanasuna zona que muestra el desarrollo de procesoso cársicos.

6.2. Estudio y distribucion de las pendientes.

Es necesario su estudio porque las mismas constituyen un criterio geomorfelógico importante para la formación, desarrollo ynconservación de las cortezas de intemperismo porque en dependencia del rango dependientes así será el tipo de depósito formado (Anexo Nº3).

Estudiaremas estaspor rangos:
-Rango dependiente de 0-50

Se hallan distribuido por tada la región de forma irregular aunque sus mayores sectores se observa en zonas de relieve bajo así como en las llanuras de inundación delcurso de los ráos, aunque que se encuentran algunos pequeños sectores en niveles hipsométrico de 70-500m y más Esta pendiente están drelacionadas con depósitos eluvia les; corteza de intemperísmo bien desarrollada.

Desde el punto de vista geomorfológico son muy pespectivas.

-Rango de pendientes de 5-10°

Se encuantra en toda la región, su mayores áreas se ubican en el Noroeste y Sureste de la región. No tienen unnivel hipsométrico definido aunque sus sectores más representativos estan en los niveles de 70-500m.

Se vincula fundamentalmente a depósitos eluvios-deluviales, deluvio -eluviales.

Son perspectivas por que los sedimentos detríticos son trasladados a poca distancia del lugar de su formación - llegando a formar áreas con materiales lateríticos depositados y es frecuente las áreas de depósitos redepositados.

Pertenece al grupo dependiente denudativas,

-Rango de pendientes de 10-150.

Se hallan enttoda la región en sectores aislados, su mayor concentración se sitúa en la parte noroeste asociada a niveles hipsométricos de 70-500m: Les depósitos a los cuales se vincula este rango de pendientes son los de tipos deluvio-eluviales con amplias áreas de cortezas redepositadas. Son poco favorable para el desarrollo de --- cortezas.

Son pendientes denudativas.

-Rango dependientes mayores de 15°.

Constituye el rango más distribuido en toda la región con gran uniformidad. Se vincula con niveles hipsométricos de 70-500m y mayores. Estas se asocial los depósitos deluviales poco potente generalmente, puede existir bolsones de varios metro de es pesor.

No ofrece pespectividad. Son pendientes tectónicos-denudativas

6.3. Análisis de les mapas de isobasitas y de diferencia de isobasitas.

El estudio de los mapas de isobasitas para el caso de muestra región de estudio no son confiable en los resultados por la complejidad del relieve así como la existencia de estructuras muy plegadas y falladas.

Sin embargo em los mapas de diferencias de isobasitas de - 2do y 3er órden se observa la existencia de un gran múmero de estructuras locales en la mayor parte de la región de - estudio que son reflejo de los movimientos neotectónicos-más jóvenes.

En el mapa de diferencia de isobasitas de 2do y 4to 6rden e es posible detectar 10 estructuras locales de carácter — isométrica y sin dirección preferencial.

6.4. Análisis de los manas de relieve residual.

En nuestra región de trabajo se observan 5 sistemas diferentes de orientación del relieve residual (Anexo 5).

-1er Sistema de orientación.

Se encuentra representado por 3 grupos que tienen cotasde 300m, donde predominan las formas circulares. Este sis tema se desarrolla sobre rocas ultrabásicas y sedimenta rias, entre otras.

La dirección del mismo en sentido general es neroeste.(NW) -2do Sistema de Orientación.

Le integran 2 grupos con dirección NE+SW, que poseen cotas de 400m además de formas irregulares.

Este sistema coincide con las Cuchillas del Toa, desarrollándose sobre rocas ultrabásicas y secuencias metamórficas fundamentalmente.

-3er.Sistema de Orientación.

Presenta cotas de 500m, su dirección es NE-SW. Tiehe forma no definida.

Se vincula a subtrato rocoso compuesto por rocas ultrabásica y rocas metamórficas.

-4to Sistema de orientación.

Lo forman 2 grandes grupos orientado en dirección W-E,relacionado a cotas con valores de 700m, de formas heterogéneas. Esto corresponden con las Cuchillas de Moa.

-5to Sistema de Orientación.

Presenta cotas de 1000m, formas redondeadas, coincidente con las regiones más elevadas de Sierra del Purial. Se desarrolla sobre rocas metamórficas.

6.5. Zonación Geomorfológica.

El clasificar nuestra área de estudio por zonas geomorfológicas se elaboró con el objetivo de conocer el relieveen sentido general, y la relación con el subtrato rocesosobre el cual se desarrolla, para la posterior valoración de las cortezas por su perpectividad, industrial (Amexo 7)

La zonación geomorfológica se efectuó apoyándones en un conjunto de criterios como: predeminio e ranges de pendientes, los niveles hipsométricos del área y su relación
con las vecinas, los valores de disección vertical y horizontal y los mapas topográficos.

Zona I. Superficies aplanadas de divisoria de aguas principales (500m)

En nuestra región de trabajo esta zona se encuentra representada por varios sectores de pequeñas dimensiones y seubican fundamentalmente en SW-y NW.

Las pendientes tienen un range de 5-10°.

La disección vertical y horizontal fue calculada para los diferentes sectores, la disección vertical oscila en un - rango de 0,170km⁻¹ - 0,390km⁻¹ siendo su valor promedio - 0,230km⁻¹.

Mientras que la disección herizental tema valores de 0,3-1,5km⁻¹ siende su valor promedio de 0,9km⁻¹.

En esta zona existe un predeminio de los procesos de meteorización de las rocas sobre los procesos de erosión—— (arranque-traslado-redeposición) de originan depósitos eluvio-deluviales que sonstituyen horizonte algo movido e área con material laterítico depositado en ocasiones hayausencia de horizonte de las cortezas.

Se desarrolla sobre rocas ultrabásicas serpentinizadas ysecuencias de rocas metamórficas tales como esquistos ver des y cleríticos-sericíticos.

Zona II. Zona de superficies desmembradas en divisiones - de aguas principales.

Se encuentra asociada a niveles hipsométricos superioresa los 600m. Se ubica en la parte sur desde las immediacio mes de la región en forma de una franja irregular que aumenta hacia la porción occidental.

En esta existe un predominio de pendientes tectónico-denudativas mayores de 15º aunque se observan pequeños sectores con otros rangos de pendientes.

La disección vertical promedio de 0,390km⁻¹ y la disección horizontal toma valores promedio de 1.70km⁻¹.

En esta zona donde las pendientes son muy abruptas, existe un predominio de los procesos erosivos sobre los procesos de meteorización de las rocas.

Aguí los procesos esosivos están representado por la acción del - escurrimiento superficial y los movimientos gravitaciones lo que afecta el desarrollo de las cortezas de intemperismo.

Los depósitos que aquí se forman son fundamentalmente deluviales. Se desarrolla sobre secuencias de la formación La Farola constituída por esquistos vardes, cleríticos-sericíticos, los cuales-estan muy plegados.

Esta zona por tener condiciones geomorfológicas generales diferente a las conocidas proponemos que estudie la posibilidad de su inclusión como nueva zona.

Zona III Superficies planas y semi-planas en nieveles hipsimétricos intermedios (70-500M).

Esta se halla distribuida en la región de estudio de forma no -homogenea, por lo que la dividimos en varios sectores.

La misma presenta pendientes con rango de 0-50 y 5-100, estandono conectada con las divisiones superiores.

Los valores de disección vertical y horizontal fueron calculado para los diferentes sectores.

Siendo la disección vertical promedio de 0,3Km-1 y los valoresde promedios de disección horizontal de 2.6Km-1.

Los depósitos característicos: eluvio-deluviales y deluvio-eluviales, también aparecen frequentemente depósitos lateríticos redepositados y zonas desmudas de cortezas.

Se encuentra desarrollada esta zona geomerfológica sobre distintos tipos de secuencias litelógicas aunque tiene mayor desarrollo sobre las rocas ultrabásicas serpentinizadas.

La zona 3 se divide en 3 sub-zona.

Sub-zona IIIa.

Se encuentra en la parte central en la porción Sur-oriental de

nuestra región de trabajo. Esta se caracteriza por un rango de pendiente de 5-10°. La dirección vertical promedio es de 0,13-KM-1, mientras que la disección horizontal tiene valores de --3Km⁻¹.

Esta sub-zona esta conectada con divisoria de aguas superiores. Sub-Zona III b.

Ocupa el extremo Oriental de nuestra región coracterizada porpendientes de 0-5º los valores de disección vertival promedioes de 6.08km⁻¹ en tanto que la disección horizontal es de 1.1 km⁻¹.

Esta sub-zona esta conectada con divisoria de agua superiores.

Sub-zona IIIc.

Se ubica en la parte Norte-Occidental y Central de la región-Posee un rango de pendientes de 5-10°. La disección verticalcalculada oscila de 0-17- a 0,20km⁻¹, en tanto que la horizontal es de 3km⁻¹ como promedio.

Zona IV. Relieve desmembrado en niveles hipsométricos intermedios (70-500m).

Esta zona comprende la mayor parte de la región de estudio, ex tendiendose desde NW-SE de forma inrregular, estando conectada con la zona II, en cambio por la dirección Este está conectada con la zona III, y en el NW se encuentra desconectada conesta misma zona.

La misma se caracteriza por el predominio de pendientes mayores de 15°, aunque también existen sectores cen rangos de pendientes de 10-15°.

La disección vertical promedio para toda la zona obtenidas enel cálculo de esta para diferente sectores es de 0,20km⁻¹ en tanto que la disección horizontal promedio es de 2,5km⁻¹.

Los depósitos característicos son los deluviales en general po co potentes, solo muy localmente sobrepasan un metro, pueden encontrarse bolsones de varios depósitoss deluvio-eluviales con extensas áreas de sortezas redepositadas.

Esta zona se desarrolla sobre varios tipos de secuencias tipolo gicas tales como esquistes verdes, clerítico-sericítico, recas ultrabásicas seppantinizadas, cuerpoes intensivos de gabros etc. Dentro de esta gran zona delimitamos una sub-zona (N-b) la cual se caracteriza per poseer pequeño valores de disección vertical (0,08km⁻¹), mientras que la disección horizontal es de 3.10km⁻¹

(máximo valor de disección horizontal), además las pendientes son de 10-15°.

Zona V. Zona de relieve bajo moderadamente desmembrado desde la costa hasta nivedes hipsométricas de (70-100).

Se extiende por toda la costa desde la parte Oriental hasta la Ocdidental. Las pendientes son suaves de pie de montaña con rango de O-5°.

La disección vertical es de 0,001km⁻¹ (valores mínimos de disección vertical) a 0,08km⁻¹ y la disección horizontal es de 1.6-a-1.8km⁻¹

Los depósitos son deluviales muy complejos y depósitos aluviales-Esta zona se desarrolla fundamentalmente sobre secuencias de varia das litologíaso.

Zona VII. Zona Pantanosa.

Se encuentra el algunos pequeños sectores en el extremo NW de la región. CAPITULO No.7

Clasificación de las zonas de desarrollo de cortezas intemperismo ferroniquelífera, en función a su pers pectividad.

7.1. Criterio para la zonación del área en zonas perspectivas.

La zonación perspectivas se elaboró sele para las áreas de desarrollo de recas ultrabásicas serpentinizadas, a partir del mapa de zonación geomorfológica, los tipos de depósitos de corteza de intemperísmo formado y el subtrato recoso resumido en la tabla adjunta al trabajo ().

En base a los expresado anteriormente se pudieron determinar en nuestra región de trabajo 4 zonas:

- 1.- Zonas Perspectiva.
- 2.- Zonas muy complejas.
- 3.- " desechables.
- 4.- " de no desarrello de depósitos lateríticos.

7.2. Metodología de los trabajos.

Para desarrollar la zonación perspectiva empleamos los siguientes mmateriales.

- a- Mapa Geológico Escala 1.5000
- b- W de Pendientes Escala 1:50 000
- c- " de zonación Geomorfológica. Escala 1.50 000
- d- Tabla adjuntos al trabajo ().
 Con el empleo de todos los materiales antes mencionados procedimos de la sgte forma:

Sobre el mapa geológico colocamo el mapa de zonación geomorfológica y sobre este último separamos las zonas de desarrollo de rocas ultrabásicas, de las que no poseen desarrollo. Para efectuar el análisis de las zonas perspectivas se tuvo en cuenta solo aquellas zonas dende exig te condiciones favorables desde el punto de vista géologogeomorfológico obteniendose así diferentes grados de perspectividad.

A cada una de estas zonas se les asignó una simbología di ferentes.

7.3. Análisis de las resultados de la valoración prenéstice. Zona Perspectiva

Su simbología es: líneas horizontales (anexo8).

Em nuestro región de estudio se encuentra ubicada en la parte Norte-Occidental, asociada a niveles hipsemétricesintermedios (70-500m). La misma presenta pendientes con rango de 5-10° estando no conectada con la divisoria superiores. Los depósitos característicos son eluvio-deluviales y deluvio-eluviales, también aparecen adapósitos redepositados y zonas desmudas de corteza.

Esta zona se desarrella sobre un sustrato recese compues to selamente per recas untrabásicas y corresponde a laszonas geomorfelógicas I, III e y IVa.

Zonas muy complejas.

Su simbología sont líneas oblicuas contínuas y discontínuas (anexoô).

Se ubica ocupando una franja estrecha en la parte Norte,otra zona se encuentra en la parte Central de la región y una tercera en la porción Sur Oriental.

Estas se encuentra relacionada a zona de relieve bajo moderadamente desnumbrada desde la costa hasta niveles hipsométricos de (70-100m) y también a superficies planas y samiplanas en niveles hipsométricas intermedios (70-500m).

La misma presenta rangos de pendientes de 0-5° y 5-10° es tando no conectadas con las divisiones superiores.

Los depósitos presentes son: eluvio-deluviales, deluvio-eluviales, deluviales muy complejos redepositados, aluviales y es frecuente encontrar depósitos lateríticos redepositados.

Estas zonas se encuentran desarrelladas sobre rocas ultrabásicas y el mélange da Picota, el cual se haya fuer temente fracturado por sistemas de fallas.

Pertenecen a la zonas geomorfológicas clasificada con los múmeros: IIIa, IIIc, IVb.

Zonas de no desarrelle de depósitos laterítico.

Ssta zona se representa en el anex8 por el Color Blanco.

Ocupa en nuestra región es estudio aproximadamente el 50% del drea total, distribuída en toda la región aunque la mayor par te se ubica ah sur de la región, esta no se asocia aun nivelhipsométrico determinadom aunque en algunas áreas existen con diciones favorables desde el punto de vista geomorfológicopara el desarrollo de corteza de intemperísmo desde el punto de vista geológico no esta presente el subtrato rocoso adecua do, pues está formado por secuencia metafórficas y rocas de porigen sedimentaria.

A esta zona corresponde la zona geomorfológica II, IIIb, V, VII.

Zonas desechables.

Se encuentra distribuídas de forma dispersa representadas por varios sectores, siendo el mayor, el ubicado en la parte Central y Sur de la región.

La vincular con relieve desmembrado en niveles hipsométricosintermedios (70-500m) y pendientes mayores de 15°.

El tipo de depósitos característicos deluviales los que en — general, son poco potenete, pueden hallarse belsenes de varios metros también se encuentran depósitos elucio-deluviales con-extensas área de cortezas redepositadas.

Astá representada; por: Color Blance.

CAPITULO Nº 8 ..-

Conclusiones y Recomendaciones.

Capitulo 8

Luego de haber desarrollado nuestra trabajo, arribamos a las sgtes conclusiones:

- 1.La proposición de una mueva zona geomorfológica: numbrada: zona de superficies desmembrdas en divisoria de aguas principales, la cual se desarrolla en niveles hipsométricos superio res a los 600m y tiene pendientes mayores de 15°.
- 2.La región objeto de nuestro estudio geólogo-geomerfológico pu do ser dividida en: las seis zenas geomerfológicas.
- -Zona de superficies aplanadas en divisorias de aguas principales (300m).
- -Zona de superficies desmembradas en divisorias de aguas principales.
- -Zona de superficies plana y semiplanas en niveles hipsométrices intermedie (70-500m).
- -Zona de relieve desmembrado en niveles hipsométricos intermedios (70-500m).
- -Zona de relieve bajo moderadamente desmembrada desde la costa a niveles de (70-100m).
- -Zona Pantanosa.
- 3. La región fue dividida en 4 zona en función de su perspectivi dad, esta son:
 - -Zonas perspectivas.
 - " muy complejas.
 - " desechables.
 - " de no desarrollo de depósitos lateríticos.
- 4. La influencia de los movimientos neotectónico de carácter dis contínuo lo demuestran la série de indicios presente en la región siendo la más notable la terrazas marinas y las de origen fluviales.

Recomendaciones.

1- Aplicación de las investigaciones geomorfológica en los proyectos de búsqueda y exploración de cortezas de intemperísmo por su rapidéz y gasto económico bajo.

Bibliografía.

- 1. Academia de Ciencias de Cuba. Atlas Nacional 1970.
- 2. Ariosa Ignaga 5 " Curso de Yacimientes metálicos" 1978.
- 3. Brigada cubano-hungara. Texto explicativo (Microfilm).
- 4. Buquelsky Y. y Formel F. "Hidrogeoquímica y cuestiones de la Genesis de las cortezas de Intemperismo en Cuba" Trec.Geológica Nº12 1973.
- 5. Folber O. y A. Lopez.

"Estudio Geologo Geomorfológico del área Miranda-San Benito-. La prueba, para el pronóstico de cortezas de intemperísmo Fe. Ni y Co de interés económico".

Trabajo de Diploma- 1982

- 6. Batista A. Estudio Geologo-Geomorfológico del área Puerto, de Cayoguaneque-Sagua de Tanamo para el pronóstico de Fe, Nipou de interés económicos.

 Trabajo de diploma V.
- 7. García G.G. "Regularidades de la distribución de las certezas de intemperísmo ferroniqueliferas, de los macizos serpen tiníticos de Cuba, como base en los trabajo de búsqueda y ex ploración de los yacimientos de Ni y Co" Trabajo de Candidatura 1978,
- 8. Jain V.E. Geotectónica General
 Tomo 1.
- 9. Knipper A.L. y R. Cabrera,
 "Tectónica y Geología Histórica de la Zona de Articulación—
 entre él Mio y el Eugeosiclinal yel Cinturón Hiperbásitico—
 de Guba".

 Deblicación Personal No. 1874 Contribución o la Carlesfe de

Publicación Especial Nº2. 1974 Contribución a la Geología de Cuba.

10. Melo J.y F. Crúz.

"Estudio Geologo- Geomorfológico del área!

Calabazas- Tignabus- Santa Catalina- Jamaica"

Trabajo de diploma 1982.

11. Redriguez I,H,

"Estudio Geologo-Geomorfológico de los yacimientos lateríticos de niquel de Punda Gorda", Trabajode Diploma 1979.

Agradecimientos:

Es lo filtimo que deseamos expresar antes de terminar este trabajo. los cuales dedicamos a la compañera Alina Rodrígues por sus opiniones y críticas constructivas para el desarrolle exitose de este trabaja, a los compañeros que laboraron en la tarea de mecanografiado de todo los materiales, al estudiante R. Oliva González "Pécnico Pantográfico", a muestros amigos per sus ideas y obtáculos .

A nosotros por haber solucionado nuestras contradiciones noantagónicas.

11:00 AM. 22/6./1985 Tag